



Incidencia de Flebitis asociada a Catéteres Centrales de Inserción Periférica en UCI Adultos: Implementación de un Protocolo para Enfermería

Abril de 2017

RESUMEN

Justificación: La flebitis es una de las complicaciones más frecuentes de los Catéteres Centrales de Inserción Periférica. La evidencia científica sobre la utilidad de las escalas de medición para el diagnóstico de flebitis es escasa.

Objetivos: Comparar la incidencia de flebitis antes y después de la implementación de un protocolo.

Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo en 159 pacientes ingresados en UCI, a los que se les ha colocado un PICC, en dos periodos equivalentes de dos años consecutivos, Periodo 1 (n=59); frente a un grupo del Periodo 2 (n=100) en el que se aplicó un nuevo protocolo para el diagnóstico y manejo de flebitis (definición de flebitis, aplicación de la Visual Infusion Phlebitis Score y valoración continua).

Resultados: El riesgo de ser diagnosticado de flebitis fue significativamente menor en el P2 (OR: 0.09, I.C.95% 0.01-0.52)

Conclusiones: La incorporación del protocolo redujo un 90% los diagnósticos de flebitis.

Palabras clave: Catéter Central de Inserción Periférica; Flebitis: Visual Infusion Phlebitis Score; Protocolo; UCI

NOTA: Si desea el artículo completo en el idioma de publicación original (inglés) sólo debe solicitarlo a la secretaría de CODEINEP: info@codeinep.org mencionando el nombre del resumen.